



La Douleur et le fait

Parfois, les enfants ont besoin de médicaments opioïdes à la maison

Les opioïdes sont un groupe de médicaments antidouleur servant à traiter la douleur modérée à grave

En général, il faut prendre des opioïdes pendant moins de 3 à 5 jours pour une blessure ou une douleur aiguë après une chirurgie

La morphine, l'hydromorphone et l'oxycodone sont des exemples de médicaments opioïdes

Les opioïdes devraient être gardés dans un contenant verrouillé, hors de la portée des enfants, des adolescents et des animaux de compagnie

La plupart du temps, les opioïdes sont utilisés en même temps qu'un médicament non opioïde pour soulager la douleur (comme de l'ibuprofène ou de l'acétaminophène)

S'il reste des opioïdes, il faudrait les rapporter à la pharmacie dès que possible

Il ne faut pas donner les médicaments opioïdes d'un enfant à quelqu'un d'autre



Scanner ici!

Pour plus d'informations, pour davantage d'outils et pour donner vos commentaires sur l'utilité de cette ressource.

linktr.ee/youthinpain

Le présent document a été produit grâce à une subvention de partenariat de la Fondation de l'Hôpital pour enfants Stollery par l'intermédiaire de l'Institut de recherche sur la santé des enfants et des femmes et à la contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada.



kidsinpain.ca

#PasBesoinDeFaireMal

@kidsinpain

