



# La Douleur

## et le fait

# L'ibuprofène est meilleur que la morphine pour les blessures musculaires et osseuses

Les entorses et les fractures (os cassés) peuvent causer beaucoup de douleur

L'ibuprofène a moins d'effets secondaires que la morphine

L'ibuprofène donne d'aussi bons résultats que la morphine pour traiter la douleur d'une fracture (os cassé) chez les enfants

L'ibuprofène devrait être utilisé avec d'autres traitements non médicinaux, comme l'application de glace, la distraction et le repos

Après une blessure, la plupart des enfants ont besoin de médicaments pendant les 3 premiers jours seulement



Si votre enfant ressent encore beaucoup de douleur après avoir pris de l'ibuprofène, discutez-en avec un professionnel de la santé



Scanner ici!

Pour plus d'informations, pour davantage d'outils et pour donner vos commentaires sur l'utilité de cette ressource.

[linktr.ee/youthinpain](https://linktr.ee/youthinpain)

Le présent document a été produit grâce à une subvention de partenariat de la Fondation de l'Hôpital pour enfants Stollery par l'intermédiaire de l'Institut de recherche sur la santé des enfants et des femmes et à la contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada.



Douleur chez les jeunes  
solutions pour un usage efficace des opioïdes

[kidsinpain.ca](https://kidsinpain.ca)

#PasBesoinDeFaireMal

@kidsinpain

